

Manejo de Toxicidade Cutânea Induzida por Droga Anti-EGFR (Panitumumabe, Cetuximabe)

Profilaxia:

Hidrocortisona 1% creme 2 vezes ao dia (Ex. Berlison ®)	Hidratante preferencialmente com Uréia 10% 2 vezes ao dia (Nutraplus®, Ureadin 10%, Cethapil®, Udderly Smooth)	Doxiciclina 100mg/dia por 6 semanas contínuo	Protetor solar diário
---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------

Tratamento

Doxiciclina 100mg 2 vezes ao dia 12/12 por 10-14 dias seguido da profilaxia	Clindamicina 1% gel/creme à noite antes de dormir. Lavar rosto ao acordar (Ex. Clindoxyl gel 1%)	Hidratante preferencialmente com Uréia 10% 2 vezes ao dia (Nutraplus®, Ureadin 10%, Cethapil, Udderly Smooth)	Protetor solar diário
--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

Opção à doxiciclina: Minociclina 100mg/dia. Não realizar tetraciclina, fotoproteção isolada, pimecrolimos 1% , vitamina K1 creme ou acitretina.

Fonte: Adaptado de Lacouture et al *Practice guidelines for the prevention and treatment of EGFR inhibitor-associated dermatologic toxicities. Support Care Cancer.* 2011;19:1079–95